



MINISTÈRE
DU TRAVAIL
DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Liberté
Égalité
Fraternité

الإنهاء الطوعي لل الحمل (الإجهاض) IVG

الملف الإرشادي



3	مقدمة
6	المرحلة الأولى: استشارة بشأن المعلومات
8	المرحلة الثانية: الحصول على الموافقة
10	المرحلة الثالثة: إحراء الإنماء الطوعي للحمل IVG (الإجهاض)
11	اجهاض باستعمال أدوات طيبة.....
12	اجهاض باستعمال أدوية
15	المرحلة الرابعة: استشارة المتابعة
17	منع الحمل بعد الإنماء الطوعي للحمل IVG (الإجهاض)
17	الوصفة الطيبة لمنع الحمل
18	اختيار وسائل منع الحمل
18	استخدام وسائل منع الحمل
19	أين يمكنني العثور على معلومات إضافية حول وسائل منع الحمل؟
21	الملاحق

مقدمة

الحق في الإجهاض هو إنجاز رئيسي للمرأة وثمرة كفاح طويل ليأخذن بزمام أجسادهن. يشير الملحق 5 من هذه الوثيقة إلى المراحل المختلفة التي أدت إلى ضمان هذا الحق بموجب القانون.

سواء كانت بالغة أو قاصرة، يمكن لأي امرأة حامل لا ترغب الاستمرار في الحمل أن تطلب من الطبيب أو القابلة إنهاء الحمل. يمكن للمرأة المعنية فقط أن تطلب ذلك.

يمكن إجراء إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG قبل نهاية الأسبوع الرابع عشر من الحمل، والذي يوافق نهاية الأسبوع الذي يلي بداية آخر دورة شهرية (16 أسبوعاً من انقطاع الطمث).



من أجل احترام المعايد النهائية، فمن المهم، عند اتخاذ قرار الإجهاض، بدء العملية بسرعة.

هناك طريقتان محملتان لإجراء إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) :IVG

• **طريقة باستعمال أدوات** : يمكن إجراؤها فقط من قبل طبيب أو قابلة مدربة، ويتم تنفيذها في مركز أو مؤسسة صحية:

• **طريقة باستعمال أدوية** : يمكن إجراؤها بواسطة طبيب أو قابلة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع التكاليف المتعلقة بإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG يسددها التأمين الصحي بنسبة 100٪ (الملحق 2).


كما هو منصوص عليه في اللوائح المعمول بها، يهدف هذا الدليل إلى مساعدتك في تحديد اختيارك وتزويدك بالمعلومات الالزمة لإجراء الإجهاض.

المعلومات متاحة أيضًا:

- على الرقم الوطني بشكل مجهول الهوية ومجاني "النشاط الجنسي - منع الحمل - الإجهاف": **11 11 .0800 08**
- على الموقع الرسمي الوطني : <https://ivg.gouv.fr/>
- في مراكز الصحة الجنسية (مراكز CPEF سارقاً لتنظيم الأسرة أو التعليم) أو في مؤسسات المعلومات والاستشارات والإرشاد الأسري التي تسمى حديثاً "أماكن الحياة العاطفية والجنسية وإقامة العلاقات" (EVARS). تظهر عناوين وتفاصيل الاتصال بهذه المنشآت، التي أنشأتها الإدارة، على: <https://ivg.gouv.fr/>
- على موقع الإنترنت الخاص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: <https://solidarites-sante.gouv.fr/>

أريد إنهاء حملتي

سأحدد موعداً مع طبيب أو
قابلة على الفور



إذا كنت ترغبين في إنهاء الحمل لديك، يمكنك تحديد موعد مع طبيب أو قابلة:

- في مكتب المدينة.
- في مركز الصحة الجنسية (مراكز CPEF سارقاً).
- في مركز صحي.
- في منشأة صحية (مستشفى أو عيادة).


يمكنك طلب تحديد موعد للاستشارة المباشرة بالحضور أو خدمة الاستشارة الطبية عن بعد (إذا عرض عليك ذلك) (انظر الملحق 3).



انتبه إلى حالات التأخير في إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG ، خاصة إذا كان مخططاً له في مؤسسة صحية.

لا تمارس جميع المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة كلاً طريقي الإجهاض الإثنيين معاً (باستعمال أدوات وباستعمال أدوية). من المهم الحصول على المعلومات في أقرب وقت ممكן من المؤسسة المختارة أو من الرقم الوطني بمجهول الهوية ومجاني "الأمور الجنسية - وسائل منع الحمل - إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض)" .IVG": 0800 08 11 11

بعض المؤسسات مكتظة بالمرضى وقد تكون حالات التأخير طويلة جدًا. من الضروري أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد موعد.





المرحلة الأولى: الاستشارات الاستعلامية

المرحلة الأولى: استشارة بشأن المعلومات

1



- يطلعني الطبيب أو القابلة على المعلومات ويعطيني الوثائق، وأنا لا أتردد في طرح الأسئلة عليه
- يقدم / تقدم لي استشارة نفسية اجتماعية

الاستشارات النفسية والاجتماعية

< إلزامية للقصر

< اقتراح للبالغين

< لعرفة إلى أين أذهب ولأكون على علم بحقوقي:

خدمة ومقابلة
احفاء وسرية الهوية ومحابي + 33 (0) 11 11 08 800



خلال هذه الاستشارة:

- تطلبين الإجهاض.
- تتلقى هذا الملف الإرشادي والمعلومات الشفوية:
- حول الأساليب المختلفة للإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG : باستعمال أدوات طبية وباستعمال أدوية (راجع "إجراء الإجهاض"، الصفحة 10).
- بشأن أماكن إجراء الإجهاض وعلى وجه المخصوص إمكانية الاختيار التي لديك:
 - للإجهاض باستعمال أدوات طبية: في منشأة صحية (مستشفى، عيادة) أو في مركز صحي مرخص،
 - للإجهاض باستعمال أدوية: في منشأة صحية (مستشفى، عيادة)، في عيادة خاصة، في مركز للصحة الجنسية CPEF (سابقاً) أو في مركز صحي،
- حول المخاطر والآثار الجانبية المحتملة.

- يقدم لك الطبيب أو القابلة مقابلة شخصية نفسية اجتماعية . إنها اختيارية إذا كنت بالغة سن الرشد، ولكنها إلزامية إذا كنت قاصرة.

ستستفيدين من الاستماع أو الدعم النفسي أو المعلومات أو النصائح المناسبة لوقفك. لحظة الاستماع والخوار هذه مهمة لرافقتك خلال هذه الفترة الصعبة في بعض الأحيان. للحصول على استشارة المعلومات الأولى هذه، يمكنك طلب تحديد موعد للاستشارة المباشر، أو عن بعد إذا قدمها أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك (انظر الملحق 3).

الاستشارة النفسية قبل الإجهاض


وهي بين المراحلتين السابقتين للإجهاض. هذه الاستشارة اختيارية إذا كنت بالغة سن الرشد، وهي إلزامية إذا كنت قاصرة.

يحدث ذلك في "أماكن الحياة العاطفية والجنسية وإقامة العلاقات" (EVARS) (المعروف سابقاً باسم مؤسسة المعلومات أو الاستشارة أو الاستشارة الأسرية (EICCF)) أو مركز الصحة الجنسية (مركز تنظيم الأسرة أو التعليم سابقاً) أو الخدمة الاجتماعية أو هيئة معقدة أخرى، مع اختصاصي مؤهل في الإرشاد الزواجي والأسري.

خلال هذه الاستشارة، سيم تم تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لك. يمكنك طلب تحديد موعد استشارة نفسية-اجتماعية شخصية، أو عن بعد (إذا عُرضت عليك) لهذه الاستشارة (انظر الملحق 3).

عندما يكون الاختصاصي (الطبيب أو القابلة) لا يقوم بإجراء الإجهاض بنفسه، يجب عليه أن يعطيك اسم طبيب أو هيئة تقوم بهذا العمل. يقوم بإرجاع طلبك ويعطيك شهادة تثبت امثاليك لهذه المرحلة الإلزامية الأولى (وقت المعلومات).

المرحلة الثانية : استلام المموافقة



المرحلة الثانية: الحصول على الموافقة



- أقرر مع طبيبي أو القابلة الخاصة بي طريقة التدخل الطبي وفقاً لحالتي وظروفي الشخصية وتوافر المراكيز الطبية
- أؤكد على طلب إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG وأرسل موافقتي الخطية
- إذا لم يجرى / تجرى الإجهاض بنفسه/ بنفسها، فإنه يعطيني / تعطيني قائمة من المتخصصين
- في هذه الحالة، يعطيني/تعطيني شهادة تثبت أنني امتنعت للخطوات التمهيدية الأولية الإلزامية

لم يعد هناك أدنى وقت للتفكير بين المراحلتين الأولى والثانية. عليك أن تأخذ وقتاً للتفكير الذي تراه ضرورياً لاتخاذ قرارك، مع مراعاة الموعد النهائي القانوني لإجراء الإجهاض (14) IVG أسبوعاً من الحمل).

إذا اخترت الاستفادة من المقابلة الشخصية النفسية والاجتماعية (أو إذا كانت المقابلة إلزامية لأنك قاصر)، فسيتم حدوث ذلك بين المراحلتين الأوليين من عملية إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG.

خلال هذه المرحلة الثانية:

- فانك تؤكدين طلب الإجهاض كتابياً وتعطى موافقتك للطبيب أو القابلة.
- يمكنك طلب موعد استشارة بالقابلة المباشرة أو عن بعد لوقت إستلام الموافقة هذا (انظر التفاصيل العملية في الملحق 3).

- تختارين طريقة الإجهاض ومكانها.
- إنها أيضًا لحظة مميزة وأولى بالاهتمام مع الطبيب أو القابلة:

 - لاتخاذ قرار بشأن وسيلة منع الحمل التي يجب تجهيزها بعد الإجهاض،
 - ليتم وصفها، إذا اخترت، الفحص الخاص بالعدوى المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية HIV، وكذلك فحص سرطان عنق الرحم (من سن 25).

- عندما يكون الاختصاصي (الطبيب أو القابلة) لا يقوم بإجراء الإجهاض بنفسه، يجب عليه أن يعطيك اسم طبيب أو هيئة تقوم بهذا العمل. يعيد طلبك إليك ويمنحك شهادة تثبت امثاليك للخطوتين الأولتين الإلزاميتين (مرحلة المعلومات ومرحلة تسليم الموافقة).

استشارات طبية أخرى

عندما تتطلب التقنية المتواخة تخديجاً غير التخدير الموضعي على نحوٍ كامل، فإن استشارة ما قبل التخدير إلزامية قبل العملية.



المرحلة الثالثة: إجراء الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG

المرحلة الثالثة: إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG

3

حتى نهاية
الأسبوع
السابع من
الحمل



طريقة باستعمال أدوية

- خلال الاستشارة الأولى أو بعدها في منزل، أتناول الدواء الأول (إيفيريستون) الذي ينهي الحمل في غضون 36 إلى 48 ساعة؛ أتناول الدواء الثاني (الميزوبروستول) حتى لو كان لدى نزيف من الجرعة الأولى. هذا الدواء سوف يسبب الإجهاض ويستحثه.
- يمكن أن يستمر النزيف لمدة تصل إلى 10 أيام بعد الإجهاض.

< يمكن إجراء هذه الطريقة في وجود أخصائي الرعاية الصحية أو في المنزل



حتى نهاية
الأسبوع
الرابع عشر
من الحمل



طريقة باستعمال أدوات طبية

- إذا تم التوصية باستعمال التخدير العام أو اختياره، فإن أحد موعداً لاستشارة ما قبل التخدير.
- تستغرق العملية حوالي عشر دقائق.
- تخدير موضعي أو عام؛ أدخل المستشفى لبعض ساعات فق.

< يمكن إجراء هذه الطريقة في منشأة أو مركز صحي

هناك طريقتان للإجهاض

- طريقة باستعمال أدوات طبية؛
- طريقة باستعمال الأدوية.

تعتمد التقنية المستخدمة على اختيارك وتطلعاتك وأي موانع استعمال طبية تتعلق بصفتك أو ظروفك العيشية ومدة حملك. يمكنك الاختيار بمساعدة الطبيب أو القابلة.

الإجهاض باستعمال أدوات طبية

يمكن إجراء الإجهاض باستعمال أدوات طبية حتى نهاية الأسبوع الرابع عشر من الحمل، أي بعد 16 أسبوعاً من بداية الدورة الشهرية الأخيرة.

يتم إجراؤه بواسطة طبيب في **منشأة صحية أو مركز صحي معتمد** أو بواسطة قابلة مدربة تمارس المهنة في منشأة صحية بالنسبة لأولئك الذين يؤدون هذه الممارسة الطبية **1**.

عملية الإجهاض باستعمال أدوات طبية

← الطريقة

يتكون الإجهاض باستعمال أدوات طبية من شفط محتويات الرحم بعد توسيع عنق الرحم. يمكن تسهيل فتح عنق الرحم عن طريق إعطاء الدواء. يتم إدخال قنية من مقاييس مُناسب لمرحلة الحمل من قبل الطبيب أو القابلة في داخل الرحم لسحب محتويات الرحم.

← التخدير

يمكن إجراء العملية تحت تأثير التخدير الموضعي أو العام. إنك تختارين، بمساعدة الطبيب أو القابلة، طريقة التخدير الأنسب لحالك.

← التنفيذ

في أغلب الأحيان، تكون الملاحظة ومتابعة التنفيذ لمدة بضع ساعات كافية في المؤسسة أو المركز الصحي للإجهاض، حتى لو تم إجراؤه تحت تأثير التخدير العام. تستغرق العملية حوالي عشر دقائق. سيم ت تقديم وسائل منع الحمل لك بمجرد إجراء الإجهاض من أجل فعالية فورية.

1 بانتظار مرسوم تطبيق قانون 2 مارس 2022، الذي يعمم ممارسة الإجهاض باستعمال أدوات طبية من قبل قابلة مدربة تعمل في مؤسسة صحية، يتم تنفيذ هذه العملية في إطار تجاري في عدد قليل من المؤسسات.

ما هي المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء الإجهاض باستعمال أدوات طبية؟

المضاعفات الفورية نادرة:

- حدوث نزيف أثناء الإجهاض هو أمر نادر جدًا!
- انتقام الرحم أثناء الشفط باستعمال أدوات طبية هو حدث استثنائي.

من النادر حدوث مضاعفات بعد الإجهاض. ومع ذلك، في الأيام التي تلي العملية، يمكن في بعض الحالات، تظهر عليك:

- حمى مع درجة حرارة تزيد عن 38 درجة مئوية؛
- فقدان للدم بشكل كبير؛
- آلام شديدة في البطن؛
- توعك وأحساس عام بالرثى.

إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض / العلامات المرضية، **عندئذ يجب عليك الاتصال سريعاً بالمنشأة التي تم فيها إجهاضك أو، إذا تعذر ذلك، فيجب عليك الاتصال بقسم الطوارئ الأقرب إليك، لأن هذا قد يكون علامة على حدوث مضاعفات.**

فعالية الطريقة

تبلغ نسبة نجاح طريقة استعمال أدوات طبية 99.7%， لذا فإن خطر الفشل منخفض جدًا.

الإجهاض باستعمال الأدوية

يمكن إجراء الإجهاض باستعمال الأدوية حتى نهاية **الأسبوع السابع من الحمل**، أي بحد أقصى 9 أسابيع بعد بدء آخر دورة شهرية.

يتم إجراء الإجهاض باستعمال الأدوية:

- في منشأة صحية (مستشفى، عيادة)؛
- في عيادة خاصة، بها طبيب أو قابلة معتمدة؛
- في مركز صحة جنسية معتمد (مركز تنظيم الأسرة أو التعليم سابقاً)؛
- في مركز صحي معتمد.

في المدينة، يُسمح فقط للأطباء أو القابلات الذين أبرموا اتفاقية مع مؤسسة صحية بإجراء عمليات الإجهاض باستعمال الأدوية.

يمكن إجراء الإجهاض باستعمال الأدوية كلية أو جزئياً عن طريق خدمة الاستشارة الطبية عن بعد (الملحق .(3)

أسلوب الإجهاض باستعمال الأدوية

يتكون الإجهاض باستعمال الأدوية من تناول دوائين:

1. أخذ الميفيريسنون

هذا الدواء **يبدأ في إنهاء الحمل**. يتم تناوله إما في المنزل أو أثناء الاستشارة. يمنع عمل الهرمون الضروري للحفاظ على الحمل (البروجسترون)، ويعزز تقلصات الرحم وفتح عنق الرحم. من هذه المرحلة الأولى، قد يحدث نزيف وألم شديد بعض الشيء، ولكن في معظم الأحيان تبدأ الأعراض بعد تناول الدواء الثاني.

النزيف ليس علامة على انتهاء الحمل. لذلك من الضروري تناول الدواء الثاني .



يمكن وصف طريقة منع الحمل المختارة لك خلال هذه الاستشارة.

2. تناول الميزوبروستول، بعد 24 إلى 48 ساعة

يم تناول هذا الدواء إما في المنزل أو أثناء الاستشارة أو أثناء الإقامة القصيرة في المستشفى. يزيد من التقلصات الرحمية ويسبب الإجهاض. تسبب تقلصات الرحم لثا شببها بألم الدورة الشهرية، وأحياناً يكون أقوى من ذلك (ألم الحوض) ويمكن تخفيفه بوصفة المسكنات.

يمكن أن يحدث النزيف الغزير الذي غالباً ما يصاحب تفريغ الحمل بسرعة كبيرة بعد تناول الميزوبروستول، ولكن في بعض الأحيان يحدث في وقت لاحق:

- في 60% من الحالات، يحدث تفريغ الحمل خلال 4 ساعات من تناول الميزوبروستول.
- في 40% من الحالات، يتم تفريغ الحمل خلال 24 إلى 72 ساعة من تناول الميزوبروستول.

عادة ما يسمى التزيف لمدة أسبوعين.

لا تتطلب هذه الطريقة تحدير أو جراحة إذا نجحت.

ما هي المشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء الإجهاض باستعمال الأدوية؟

الأحداث السلبية الفورية الأكثر شيوعاً وغير المقلقة هي:

- آلام الحوض التي يصف لها الطبيب أو القابلة المسكنات؛
- نزيف.
- اضطرابات الجهاز الهضمي: الغثيان والقيء والإسهال.

في الأيام التي تلي الإجهاض، إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض/العلامات، يجب عليك حينذاك الاتصال سريعاً بالختص الذي اشرف على إجهاضك، لأن هذا قد يكون علامة على حدوث مضاعفات:

- حمى مع درجة حرارة تزيد عن 38 درجة مئوية؛
- فقدان دم شديد؛
- آلام شديدة في البطن؛
- توترك وأحساس عام بالمرض.

المذكورة العملية الإنهاط الطبي الطوعي للحمل في المنزل الذي يظهر في الملحق 4 من هذا الملف يرافقك خلال هذه العملية ويشرح ويسرد الأعراض التي يجب الانتباه إليها.



فعالية الطريقة

تبلغ نسبة نجاح طريقة استعمال الدواء حوالي 95%.

في كلتا الحالتين (الإجهاض باستعمال الأدوية أو الإجهاض باستعمال أدوات طبية)، إذا كانت فصيلة دمك تحمل عامل ريسوس RH سلبي، ستتلقين حقنة من أجسام مضادة بباما جلوبولين D في موعد لا يتجاوز 72 ساعة بعد بدء التزيف لتجنب حدوث مضاعفات أثناء الحمل في المستقبل. تذكر إحضار بطاقة فصيلة الدم الخاصة بك.





المرحلة الرابعة: استشارة المتابعة IVG

المرحلة الرابعة: استشارات المتابعة

4



> إلزامي
لضمان نجاح العملية وعدم وجود
مضاعفات.



الاستشارات النفسية والاجتماعية


إذا شعرت بال الحاجة إلى ذلك

استشارة المتابعة ضرورية للغاية بعد الإجهاض. تضمن إنهاء الحمل وعدم حدوث مضاعفات. يجب أن يتم ذلك بين اليوم الرابع عشر واليوم الحادي والعشرين بعد الإجهاض، وأحياناً قبل ذلك حسب الظروف السريرية.

- في إطار الإجهاض باستعمال أدوات طبية، تقومين بإجراء هذه الاستشارة مع الطبيب أو القابلة.
- في إطار الإجهاض باستعمال الأدوية، تحدث:
 - في عيادة الطبيب أو القابلة
 - في مركز للصحة الجنسية (مركز تنظيم الأسرة أو التعليم سابقاً)
 - في مركز صحي معتمد
 - في منشأة صحية

يمكن أن تحدث عن بعد كجزء من خدمة الاستشارة الطبية عن بعد. (انظر الملحق 3).

أثناء استشارة المتابعة، يناقش الطبيب أو القابلة معي وسائل منع الحمل مرة أخرى إذا كنت ترغبين في جعلها مناسبة مع وضعك.
كما يعرضن عليك الاستفادة من مقابلة نفسية اجتماعية إذا كنت ترغب في ذلك.



منع الحمل بعد الإجهاض

توجد إمكانية حدوث حمل جديد بعد الإجهاض مباشرةً. لذلك من الضروري استخدام وسيلة منع الحمل فوراً بعد العملية إذا كنت في حاجة إليها.



تسمح لك الاستشارات الطبية التي يتم إجراؤها لإجراء الإجهاض بالحصول على معلومات مفصلة عن وسائل منع الحمل المتاحة ومناقشة الطبيب أو القابلة لاختيار وسائل منع الحمل المناسبة لك. نظراً لأن الحمل يمكن أن يحدث بسرعة، فسيتم البدء في استعمال وسيلة منع الحمل المختارة في أقرب وقت ممكن بعد إجراء الإجهاض.

وصفة منع الحمل

يمكن أن يصف وسائل منع الحمل بعد الإجهاض:

- الأطباء.
- القابلات.

تقديم مراكز الصحة الجنسية (مركز تنظيم الأسرة والتعليم CPEF سابقاً) الأدوية أو وسائل منع الحمل مجاناً للقاصرات اللاتي يرغبن في حفظ وكمان السر وللأشخاص الذين لا يقتنون بتغطية الضمان الاجتماعي.

الاستشارة الأولى لمنع الحمل والوقاية من الأمراض المنقلة عن طريق الاتصال الجنسي (تسمى استشارة لمنع الحمل والوقاية CCP) متاحة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً وتم تغطيتها بنسبة 100%.¹ لا توجد رسوم زائدة ممكنة.

بالنسبة للشبابات دون سن 26 عاماً، فإن الدورة التثقيفية الكاملة لمنع الحمل التي يتم إجراؤها مع طبيب أو قابلة (استشارات²، فحوصات بيولوجية)، بالإضافة إلى توصيل وسائل منع الحمل التي يغطيها التأمين الصحي مجانية ومحمية بالسرية، إذا رغبت الشابة في ذلك.

بالنسبة إلى "الاستشارة لمنع الحمل والوقاية" CPP، لا يتم السماح برسوم زائدة. استشارة واحدة في السنة واستشارة متتابعة واحدة في السنة الأولى للوصول إلى وسائل منع الحمل. لا يتم دعم تجاوز الرسوم.

1
2

اختيار وسائل منع الحمل

لساعدتك في اختيارك، يتم سرد طرق منع الحمل المختلفة المتاحة في الملحق 4. لا يوجد طريقة ممنوعة الاستعمال بعد الإجهاض، إلا في حالات خاصة.

تنفيذ منع الحمل

يمكن وضع وسيلة منع الحمل التي تختارها المرأة بمجرد إجراء الإجهاض.

يمكن وضع جهاز داخل الرحم (نحاسي أو بروجسترون) مباشرة بعد إجراء الإجهاض باستعمال أدوات طبية (إلا في حالة حدوث نوبة معدية) أو أثناء زيارة المتابعة للإجهاض باستعمال الأدوية.

يمكن بدء مواعي الحمل الهرمونية أو الإستروجين - البروجستيرون (حبوب منع الحمل، لصقة جلدية) أو البروجستيرون (حبوب، غرسة، حقن عضلي):

- في نفس اليوم أو اليوم التالي للإجهاض باستعمال أدوات طبية:
- يوم تناول الميزوبروستول - تناول الدواء الثاني - للإجهاض الدوائي.

يمكن استخدام الواقي الخارجي (ولذلك يسمى الذكري) أو الواقي الداخلي (ولذلك الأنثوي) بمجرد استئناف الاتصال الجنسي. إنها مواعي الحمل الوحيدة التي تحمي من الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز HIV-AIDS.

علاوة على ذلك، لا يوصى باستخدام وسائل منع الحمل التي تتطلب دخولها في المهبل (الحلقة المهبلية، وغطاء عنق الرحم، وما إلى ذلك) مباشرة بعد العملية، خلال الدورة الشهرية الأولى بعد الإجهاض.

وسائل منع الحمل الطارئة

تقلل وسائل منع الحمل الطارئة من مخاطر الحمل غير المرغوب فيه بعد الاتصال الجنسي غير المحمي أو الذي يفتقر إلى حماية سليمة (نقص وسائل منع الحمل، ونسيان حبوب منع الحمل، وكسر الواقي الذكري، وما إلى ذلك).

يفضل أن يظل استخدامه بشكل عابر؛ لا يمكن أن تحل محل وسائل منع الحمل الدائمة. تصل فعالية وسائل منع الحمل الطارئة إلى الحد الأقصى إذا تم تناولها في غضون ساعات قليلة من الجماع، وفي غضون 5 أيام على الأكثر.

هناك نوعان من وسائل منع الحمل الطارئة:


- وسائل منع الحمل الهرمونية الطارئة، التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية ويتم سداد تكاليفها بنسبة 100% بجميع حاملي وثائق التأمين الاجتماعي في الصيدليات. وهي مجانية ويتم صرفها مع إخفاء الهوية للقاصرات.

- الجهاز النحاسي داخل الرحم، بموجب وصفة طبية (طبيب، قابلة) مجاني بموجب وصفة طبية حتى سن 26، ثم يتم سداده بنسبة 65% من سن 26.

موانع الحمل الطارئة الهرمونية ليست موثوقة بنسبة 100%. الجهاز الرحمي هو أكثر وسائل منع الحمل الطارئة فعالية. إذا لاحظت، على الرغم من استخدامه، تأخراً في الدورة الشهرية وحدث الحمل، فمن المهم استشارة الطبيب أو القابلة.

أين يمكنني العثور على معلومات إضافية حول وسائل منع الحمل؟

- في مراكز الصحة الجنسية (مركز تنظيم الأسرة والتعليم CPEF سابقاً) بالإضافة إلى مؤسسات المعلومات والاستشارات والإرشاد الأسري (EICCF) أو أماكن الحياة العاطفية والجنسية EVARS. تفاصيل الاتصال الخاصة بهذه المنشآت، التي أنشأتها الإداره، متاحة على موقع الإنترنط المذكورة أدناه.
- من الرقم الوطني المجاني ومع إخفاء الهوية "الأمور الجنسية - وسائل منع الحمل - إنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG": **0800 08 11 11**.
- على موقع الإنترنط التالية:
- يساعدك هذا الموقع على اختيار أفضل وسيلة لمنع الحمل تتناسبك وفقاً لمط حياتك ووضعك الشخصي؛
- يوفر لك هذا الموقع مفيدة حول عمليات الإجهاض ومنع الحمل بعد الإجهاض.



اللاحق

ملحق 1

22 خصوصيات الإجهاض لدى الشابات القاصرات تحت سن الرشد

الملحق 2

23 التكلفة الإجمالية للإجهاض

الملحق 3

27 الإجهاض في خدمة الاستشارة الطبية عن بعد

الملحق 4

28 مذكرة عملية حول الإناء الطوعي للحمل باستعمال الأدوية في المنزل

الملحق 5

36 وسائل منع الحمل

الملحق 6

38 المراجع التشريعية والتنظيمية

خصوصيات الإجهاض لدى الشابات القاصرات تحت سن الرشد

يسمح القانون لأي امرأة حامل، بما في ذلك القاصرة، التي لا تريد الاستمرار في الحمل، أن تطلب من الطبيب أو القابلة إنهاء الحمل.

إذا كنت قاصرة، يجب أن تطلب هذا التدخل بنفسك دون حضور أي شخص آخر.

بموافقة الوالدين

يمكنك أن تختر طلب موافقة أحد والديك أو ممثلك القانوني، وبالتالي تكون مصحوباً بأحد هؤلاء الأقارب في عملية الإجهاض.

بدون موافقة الوالدين

إذا كنت ترغبين في إخفاء السر عن والديك أو إذا لم يتم الحصول على موافقتهما (رفض الوالدين إعطاء موافقتهما أو استحالة الاتصال بأحدهما)، فإن الإجهاض وكذلك الإجراءات الطبية - لا سيما التخدير والرعاية المرتبطة بهما - يتم تنفيذها بناءً على طلبك بشكل منفرد، وبالتالي لا تحتاجين إلى توقيع والديك للحصول على إذن لإجراء العملية الجراحية.

في هذه الحالات، يجب أن يرافقك في العملية شخص بالغ من اختيارك والذي لن يكون عليه التوقيع على أي مستند.

إذا كنت قاصرة وطلبت ذلك، فسيمكنك الاستفادة من إخفاء الهوية تماماً لإجراء الإجهاض ، بغض النظر عن مكان إجراء الإجهاض VG الذي اخترتـه .

لِيَمْ إِجْرَاءِ الإِجْهَاضِ:

يجب أن يكون لديك المستندات التي تثبت إتمام الإجراءات الإلزامية:

- الشهادة، التي قدمها الطبيب أو القابلة، والتي تحدد أنك امتنعت **للخطوات الطبية الإلزامية** (وقت المعلومات ووقت إعطاء الموافقة).
- شهادة استشارة نفسية.
- **تأكيد الكتابي لطلب الإجهاض.**
- موافقة خطية من والدك أو والدتك (أو ممثلك القانوني)، أو إذا لم تكن لديك هذه الموافقة **مستند ثابت** أنك اخترت البالغ المراافق.

الدُّعْمُ الْمَالِيُّ لِلْإِجْهَاضِ لِلْقَصْرِ

تنص الأحكام القانونية، على أن القاصرات غير المتر惑ات دون موافقة الوالدين، يحصلون على رعاية مع إخفاء الهوية تماماً بالإضافة إلى الإجهاض المجاني.

سواء كان الإجهاض باستعمال الأدوية أو باستعمال أدوات طبية، فلن يتم تقديم أي طلب للدفع مقابل ذلك:

- استشارات ما قبل الإجهاض؛
- فحوصات إضافية تسمح على بشكل خاص بتحديد موعد الحمل (اختبارات الدم، الموجات فوق الصوتية، إلخ)؛
- استشارة ما قبل التخدير إذا لزم الأمر؛
- تكاليف العلاج ودخول المستشفى لعمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها في مؤسسة صحية أو التكاليف المتعلقة بإجراء عمليات الإجهاض الطبي التي يقوم بها طبيب أو قابلة خارج مؤسسة صحية (استشارات لتوصيل الأدوية، استشارات المتابعة، الأدوية).

التكلفة الإجمالية للإجهاض

يتم تغطية التكاليف المتعلقة بالإجهاض بحد ذاته من خلال التأمين الصحي. منذ 1 أبريل عام 2016، يتم أيضاً سداد جميع مستحقات الفحوصات المرتبطة بالإجهاض بالكامل.

تمت تغطية الإجهاض بنسبة 100% كجزء من سعر موحد ثابت مع إعفاء إجمالي من الرسوم المسبقة لجميع النساء منذ عام 2021.

تكلفة الفحوصات التي يتم إجراؤها في المدينة

منذ 1 أبريل 2016، يتم تغطية التكاليف المرتبطة بالفحوصات الالزمة لإجراء الإجهاض بالكامل في المدينة. إنهم أشخاص خاضعين لوصفة طبية من طبيب أو قابلة، مرتبطة بالرموز التالية:

رمز الخدمة	الفحوصات المعنية	الأسعار من بداية 18 ديسمبر 2019
FPB	التحليلات البيولوجية قبل الإجهاض	69.12 يورو
FUB	الفحص البيولوجي بعد الإجهاض	17.28 يورو
IPE	التحقق من الموجات فوق الصوتية قبل الإجهاض	35.65 يورو

يمكن للطبيب أو القابلة أيضاً إصدار فاتورة، أثناء استشارة المتابعة (بعد الإجهاض)، والفحص بالموجات فوق الصوتية (الاستشارة والموجات فوق الصوتية = 30.24 يورو). لا يمكن للمختبرات الطبية البيولوجية ومراكز التصوير الطبي أن تقوم بزيادة سعر هذه الإجراءات.

تكلفة الإجهاض باستعمال الأدوية في طب المجتمع

يتم سداد مصاريف الإجهاض الطبي في المدينة (طبيب أو قابلة)، مركز صحي، مركز صحة جنسية (مركز تنظيم الأسرة والتعليم CPEF سابقاً) بنسبة 100% عن طريق التأمين الصحي، مع تحديد الأسعار بشكل ثابت بمرسوم في كل مرحلة.

الطبيب أو القابلة التي تجري الإجهاض بالكامل، تقوم بتحرير فاتورة لكل مرحلة من هذه المراحل، مقابل أجر ثابت ينص عليه المرسوم¹.

تشمل هذه التكاليف الإجمالية:

- الاستشارة الطبية لإعطاء الموافقة قبل الإجهاض. يتم سداد مصاريف هذه الاستشارة بنسبة 100% في المدينة، حتى لو تم إجراء الإجهاض بعد ذلك في المستشفى؛
- الاستشارة الطبية لأخذ الدواء،
- صرف الأدوية؛
- الاستشارة الطبية للمتابعة (التي يمكن للطبيب أو القابلة خلالها اختيار إجراء فحص باستعمال الموجات فوق الصوتية)؛
- الحقن المحمّل للأجسام المضادة للغلوبولين المناعي D للنساء ذوات عامل الريوسوس السلبي في الدم.

عندما يتم إجراء الإجهاض في إطار خدمة الاستشارة الطبية عن بعد، يتلقى الطبيب والقابلة أجرًا مقابل الاستشارات ويتلقى الصيدلي مبلغ إجمالي متزايدياً مقابل توصيل الأدوية.

تكلفة أدوية الإجهاض في المراقبة الصحية

يتم سداد مصاريف أدوية الإجهاض في المراقبة الصحية (المستشفى، العيادة) عن طريق التأمين الصحي بنسبة 100% على أساس سعر محدد وثابت يتراوح بين 353.64 يورو و 376.77 يورو اعتماداً على الإشراف والمراقبة الطبية والفحوص بالموجات فوق الصوتية بعد التدخل.

يشمل هذا السعر:

- تحليلات المختبر قبل الإجهاض؛
- الموجات فوق الصوتية قبل الإجهاض؛
- الاستشارة الطبية لإعطاء الموافقة، قبل الإجهاض، إذا لم يتم تفيذه في المدينة؛

- الاستشارة الطبية الخاصة بتناول الدواء، والاستشارة الطبية الخاصة بالتتابعة (والتي يمكن للطبيب أو القابلة خلالها اختيار إجراء المتابعة باللوجات فوق الصوتية):
 - الحقن المحمّل للأجسام المضادة للغلوبولين المناعي D للنساء ذوات عامل الريسيوسن السلبي في الدم.
 - تحليل التحكم البيولوجي بعد الإجهاض.
- يتم سداد مصاريف الفحوصات البيولوجية واللوجات فوق الصوتية التي تجري قبل وبعد الإجهاض بنسبة 100٪.

تكلفة الإجهاض باستعمال أدوات طبية

يتم سداد مصاريف الإجهاض باستعمال أدوات طبية عن طريق التأمين الصحي بنسبة 100٪ على أساس سعر محدد وثابت يتراوح من 504.41 يورو إلى 830.06 يورو اعتماداً على المنشآة (المؤسسة الصحية - المستشفى أو العيادة - أو مركز الصحة)، ونوع التخدير (الموضعي أو العام) مدة العلاج بالمستشفى.

يشمل هذا السعر:

- الاستشارة الطبية لإعطاء الموافقة، قبل الإجهاض، إذا لم يتم تنفيذها في المدينة.
 - تحليلات ما قبل الإجهاض.
 - تخدير موضعي أو عام واستشارة ما قبل التخدير إذا لزم الأمر، والإجهاض والتتابعة والاستقبال والإقامة.
 - الاستشارة الطبية للتتابعة (التي يمكن للطبيب أو القابلة خلالها اختيار إجراء فحص باستعمال اللوجات فوق الصوتية).
- لا يتم تحرير فواتير بشأن المصاريف اليومية.

النساء اللواتي لا يستفدن من استحقاقات التأمين الصحي يمكنهن فقط الاستفادة من الرعاية المجانية في مؤسسة مستشفى.



الإجهاض باستخدام الاستشارة الطبية عن بعد

يمكن إجراء الإجهاض جزئياً أو كلياً عن بعد، باستخدام التطبيب من بعد، مع تنظيم الاستشارات الطبية عن بعد بين المرأة والأخصائي الطبي. فقط إجراء الإجهاض باستعمال أدوات طبية لا يمكن أن يتم عن بعد.

وبالتالي، يمكن إجراؤه عن بعد، باستخدام الاستشارة الطبية عن بعد:

- مرحلة المعلومات،
- إذا لزم الأمر، المقابلة النفسية والاجتماعية.
- الوقت المستغرق للحصول على الموافقة وإصدار الوصفات الطبية:

← لذلك، أثناء الاستشارة الطبية عن بعد، تخبر المرأة أخصائي الرعاية الصحية عن الصيدلية التي ستقدم لها الأدوية:

← وبالتالي، يتم تسليم الأدوية للسبة للإجهاض (للجهضة) للنساء من قبل صيادلة المجتمع بعد الاستشارة عن بعد، وبعد استلام الوصفة الطبية المرسلة من قبل الطبيب المتخصص دون إصدار فاتورة حساب للمرأة.

- تناول الدواء في المنزل،
- استشارة المتابعة بعد الإجهاض.

يمكن القيام بهذه الخطوات عن طريق الاستشارة عن بعد، أو الاستشارة الشخصية المباشرة اعتماداً على اختيار الطبيب المتخصص والمرأة. للطبيب المتخصص حرية تقديم الاستشارة عن بعد أم لا: قد يرى أن الاستشارة بحضوره ضرورية، اعتماداً على حالة المرأة الصحية. للمرأة حرية قبول أو رفض الاستشارة عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها في أي وقت، سحب موافقتها وطلب رعاية شخصية مباشرة إذا رغبت في ذلك.

يتم ضمان سرية البيانات والسرية الطبية من خلال استخدام الأدوات المخصصة لممارسة التطبيب من بعد. نفس التكلفة والعلاج مماثلين سواء كان الإجهاض يحدث في وجود أخصائي أو عن بعد في حالة التطبيب عن بعد.

مذكرة عملية حول أدوية الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) في المنزل



+ تعلم

WWW.IVG.GOUV.FR

الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) باستعمال الأدوية في المنزل

مذكرة عملية





- 3 1- كيف يتم الإجهاض من تعاطي الأدوية
- 5 2- متى تقلق وماذا تفعل؟
- 6 3- وماذا بعد المتابعة؟

تعطى هذه المذكرة للمرأة أثناء صرف الأدوية أو وصفها من قبل الأخصائي الصحي، لا يستطيع انفاذ الأخصائي من التزامه القانوني بوضع ملف الدليل كاملاً للمرأة أثناء استشارة الحصول على المعلومات.

١- كيف يتم الإجهاض من تعاطي الأدوية؟

يجب تناول عقارين مختلفين على مدار فترة تراوح من 24/48 ساعة: **الميفيريستون**, ثم **الميسوبروستول**. يتم إعطاؤك هذه الأدوية أو وصفها لك من قبل الطبيب أو القابلة.

← اليوم الذي تتناول فيه الدواء الأول (**الميفيريستون**) وفي اليوم التالي

عادة ما تكون هناك **تفاعلات مهمة** بعد تناول هذا الدواء. قد تزحف قليلاً في حالات نادرة جدًا، وقد تزحف بشدة مع بعض الألم، لا تردد في تناول **مسكنات الألم** التي وصفها لك الطبيب أو القابلة. إذا لم يتوقف الألم، فاستشيري طبيبك أو القابلة. يمكنك القيام بأنشطتك بشكل طبيعي.

← اليوم الذي تتناول فيه الدواء الثاني (**الميزوبروستول**)


حتى إذا كنت قد نزفت بالفعل بعد تناول الدواء الأول، فمن **الضروري** تناول الدواء الثاني كما هو مخطط له. في الواقع، بدأ الدواء في إنهاء الحمل. إن الجمع بين هذين العقارين يسبب تقلصات ويؤدي إلى الإجهاض. لذلك فمن الضروري أن تتناوليه.

يوصى بتناول مسكنات الألم لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل تناول الميزوبروستول بسبب توقع الألم الذي يحدثه هذا الدواء.

قد يكون التزيف أكثر غزارة من الحيفن. يمكن أن يكون هذا مصحوباً بألم، مثل آلام الدورة الشهرية أو ما هو أسوأ. **الآثار السلبية الضارة** الممكنة: غثيان أوقيء، أحياناً إسهال، حمى وارتفاع الحرارة عند 38 درجة مئوية. تستمر هذه الأعراض لبضع ساعات فقط.

يحدث الإجهاض غالباً في غضون **4 ساعات** من تناول هذين الدوائين. سيحدث أحياناً في وقت مبكر أو متاخر (حتى 3 أيام).





لتضع كل الاحتمالات في جانبك:

- ← لا تنتوي التخطيط لرحلة أو حدث مهم لمدة 3 أيام لأنه في كثير من الأحيان يحدث الإجهاض بسرعة، وفي حالات أخرى فسيتم الإجهاض في غضون 3 أيام.
- ← ارتاحي في المنزل أو مع شخص تثقين به.
- ← لا تبقي وحيدة بفردك للحصول على المساعدة عند الحاجة.
- ← إذا كان لديك أطفال، فجهزي شخصاً ما يعتني برعايتهم لبعض ساعات بعد تناول الدواء الثاني.
- ← تناولي المسكنات التي وصفها لك الطبيب أو القابلة قبل الشعور بالألم حسب إرشادات الوصفة الطبية.

٢- متى تقلقني وماذا تفعلي؟

عليك إعادة الاتصال بالرकز أو الطبيب أو القابلة التي عالجتك من أجل الإجهاض.

• إذا تقيأت بعد أقل من 30 دقيقة من تناول الدواء

ادهني إلى غرفة الطوارئ التي أوصاك بها الطبيب أو القابلة مع نموذج الاتصال الخاص بك، وإذا أمكن بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بك.

• إذا كنت تعاني من نزيف شديد، أي إذا كان عليك تغيير الفوط الصحية كل 30 دقيقة (فوطة كبيرة الحجم) لأكثر من ساعتين متتاليتين

استشرى الطبيب أو القابلة التي اعنتك بك أثناء الإجهاض أو اذهب إلى غرفة الطوارئ مباشرة.

• إذا كنت تعاني من ألم شديد على الرغم من مسكنات الألم المُؤسفة لك

استشرى الطبيب أو القابلة التي عالجتك أثناء الإجهاض.

• إذا كنت تعاني من الحمى في الأيام التالية للجرعة الثانية من الدواء

استشرى الطبيب أو القابلة التي عالجتك أثناء الإجهاض (دون انتظار زيارة المتابعة المقلبة للمخطط لها).

• إذا كنت تعاني من نزيف طفيف أو لم يكن لديك نزيف في غضون 3 أيام بعد الجرعة الثانية من الدواء

في حالة القلق، اتصل أولاً بالطبيب أو القابلة التي اعنتك بك للإجهاض على الرقم:

في حالة الطوارئ، اتصل:

← مرفق الرعاية الصحية الذي أوصى بها الطبيب أو القابلة الخاصة بك

..... • الرقم

..... • العنوان

← في 112 أو 15

3 - وماذا بعد ذلك؟

استشارة المتابعة

من الطبيعي أن تترفرف لدة أسبوعين، وأحياناً حتى استشارة المتابعة.

هذه الاستشارة ضرورية لأنها تجعل من الممكن التتحقق من أن الحمل قد انتهي تماماً، وأنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية. في الواقع، في عدد منخفض للغاية من الحالات، يمكن أن يستمر الحمل في النمو على الرغم من حدوث نزيف كبير.

تم تحديد الموعد بعد 14 إلى 21 يوماً من الإجهاض

لدي موعد في:



الشهر القبل

إذ لم يكن لديك دورة شهرية أو كنت تترفين لدة من 4 إلى 6 أسابيع بعد الإجهاض، فاتصل بمركز أو الطبيب أو القابلة التي تولت رعايتك أثناء الإجهاض.

ابق مُنتبه وحذرة !

الحمل ممكّن من الشهر الأول بعد الإجهاض. هذا هو السبب في أنه من الضروري مناقشة وسائل منع الحمل في أقرب وقت ممكّن مع طبيبك أو القابلة الخاصة بك، والتي ستكون قادرة على تقديم النصائح لك بشأن الطريقة الأنسب لحفظ حياتك.

جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع على الموقع:

<https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception>

تعلم أكثر

WWW.IVG.GOUV.FR

خدمة ومكالمة
إخفاء وسرية الهوية ومجاني
11 11 08 800 (0) 33 +

الأنشطة الجنسية - وسائل منع الحمل - الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) IVG

رقم يمكن الوصول إليه في فرنسا متروبوليتان وفي مقاطعات ما وراء البحار
يوم الإثنين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، ومن يوم الثلاثاء إلى السبت من الساعة 9
صباحاً حتى الساعة 8 مساءً.

الملحق 5

الرتبة	العنوان	النوع	العنوان	النوع
١	جديد .	العنوان	جديد .	العنوان
٢	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
٣	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان


المستحبة	السلع	النحوات المحرمة	مقدرات المحظوظ	كتاب العنكبوت
		جواز وصمة طيبة في الصنفية.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	جواز وصمة طيبة في الصنفية.
	حوالى 5 لـ 20 بودر حسب النوع، لمدة حرارة.	حولى الحداة لا يتم سداد الكافيه.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	حوالى 5 لـ 20 بودر حسب النوع، لمدة حرارة.
	بوج وصمة طيبة في الصنفية.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	بوج وصمة طيبة في الصنفية.	
	لبن العادي من العيشان، طبق تقطن كل جرعة 3 درر.	لبن العادي من العيشان، طبق تقطن كل جرعة 3 درر.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	لبن العادي من العيشان، طبق تقطن كل جرعة 3 درر.
	لا يمكن اجر الالتحان للنبيذ إلا في حالة مرض.	لا يمكن اجر الالتحان للنبيذ إلا في حالة مرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	لا يمكن اجر الالتحان للنبيذ إلا في حالة مرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	لا يجوز اجر الالتحان لحالات المرض.	لا يجوز اجر الالتحان لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	لا يجوز اجر الالتحان لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.
	غير مصادف لحالات المرض.	غير مصادف لحالات المرض.	كتاب العنكبوت المكتوب معاً باللسان العربي أو جملة مثل يوسم في الميدل قبل وخطف بيم الحرف.	غير مصادف لحالات المرض.

وإذا كانت الطريقة المذكورة هنا تذكر أن الواقع الكاري (نكر الشيء) هو رسالة من العمل الواحدة التي تخص من قوى الناس المذكورة بالعمل وليس لها صلة بالمعنى الآخر، يعني ليتنا نوجهه مع طريقه الأخرى لمنع العمل:

الفرق غير موجود به، فالطريق المذكورة هنا تذكر "المهمة" التي تخص المعنيين (أحرى بذلك)، وطريقة يليغون "Billing".



العنصر الثالثة مقدمة المقدمة والمتقدمة هي قوية فرسان ليس (فردوبلن فرسن) عام 2016، حيث أخذت عددة مثل "المهمة" التي تخص المعنيين (أحرى بذلك)، وطريقة يليغون "Billing".



المراجع التشريعية والتنظيمية

الإنهاء الطوعي للحمل IVG: حق يكفله القانون

يسعى القانون (اللادة 1-2012) من قانون الصحة العامة (لأي امرأة حامل، بالغة أو قاصر، لا ترغب في الاستمرار في الحمل، أن تطلب من الطبيب إنهائه. يمكن للمرأة العنوية فقط التقدم بطلب ذلك. وهذا الحق يكفله القانون. إعاقة الإجهاض جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

2022

2 مارس •

يهدف القانون رقم 295 - 2022 إلى تعزيز الحق في الإجهاض ويمدد الفترة القانونية للإجهاض باستعمال أدوات طبية من 7 أيام إلى 14 أسبوعاً من الحمل والفتررة القانونية للإجهاض باستعمال الأدوية من 5 إلى 7 أسابيع من الحمل. كما أنه يسمح بإجراء الإجهاض باستعمال الأدوية من خلال خدمة الاستشارة الطبية عن بعد. ويصبح للقابلات المدربات بإجراء عمليات إجهاض باستعمال أدوات طبية في المؤسسات الصحية. يزيل الحد الأدنى لفترة التهدئة البالغة أسبوع واحد للفاقدرين والبالغات. أخيراً، يعاقب على رفض صرف

23 ديسمبر •

يسعى القانون رقم 1616-2022 بشأن تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2023 بالحصول المجاني على وسائل منع الحمل الطارئة دون وصفة طبية لجميع المؤمن عليهم بواسطة الضمان الاجتماعي. وسائل منع الحمل الطارئة.

2016

26 يناير •

القانون رقم 41 - 2016 بشأن تحديث نظامنا الصحي يلغى الحد الأدنى لفترة التفكير وتغيير الرأي البالغة أسبوعاً للبالغين. كما يسمح للقابلات بإجراء عمليات الإجهاض الطبي والمراكيز الصحية لإجراء عمليات إجهاض باستعمال أدوات طبية.

2014

4 أغسطس •

القانون رقم 873 - 2014 المؤرخ في 4 أغسطس 2014 للمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل يزيل مفهوم الضيق من شروط اللجوء إلى الإجهاض ويوسع جريمة عرقلة الإجهاض لتشمل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإجهاض.

2001

٤ يوليو •

القانون رقم 588 - 2001 بشأن الإنهاء الطوعي للحمل ومنع الحمل تعديل قوانين نيورث Neuwirth وساوا بـشأن منع الحمل (1967) وسيمون فيل Veil بشأن الإجهاض (1975)، وتمديد الفترة القانونية من 10 إلى 12 أسبوعاً من الحمل وتسهيل شروط الوصول وسائل منع الحمل والإجهاض للقصر.

2000

١٣ ديسمبر •

إصدار القانون رقم 1209 - 2000 بشأن منع الحمل الطارئ.

1993

٢٧ يناير •

يستحدث القانون رقم 121 - 93، على وجه الخصوص، جريمة إعاقة الإنهاء الطوعي للحمل ويلغي تجريم الإجهاض الذاتي.

1982

٣١ ديسمبر •

يحدد القانون رقم 1172 - 82 المتعلق بتغطية التكاليف الخاصة بالإنهاء الطوعي للحمل غير العلاجي وطرق تمويل هذا الإجراء تحمل الدولة للنفقات التي يت肯دها التأمين ضد المرض أثناء الإجهاض.

1979

٣١ ديسمبر •

القانون رقم 1204 - 79 بشأن الإجهاض يجعل أحكام قانون 1975 نهاية التي تزيل بوضوح بعض العقبات التي تحول دون إجراء الإجهاض.

1975

١٧ يناير •

القانون رقم 17 - 75 يسمح بالإنهاء الطوعي للحمل (IVG) المعروف باسم تم اعتماد قانون سيمون فيل "Loi Veil" لمدة خمس سنوات.

1974

٤ ديسمبر

قانون يحتوي على أحكام مختلفة تتعلق بتحديد النسل، والذي يحرر منع الحمل ويوسع أحكام قانون 1967: لا سيما سداد نفقات وسائل منع الحمل من قبل الضمان الاجتماعي وإلغاء إذن الوالدين للقصر (القانون رقم 74 1026-).

١٣ - ٢٠ ديسمبر ٢٠١٣

بعد إجراء تشريع طويل، تم اعتماد مشروع قانون الإجهاض الطوعي، المقدم إلى مجلس الوزراء في 13 نوفمبر، في 20 ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية.

يسمح القانون بالإجهاض في غضون 10 أيام، بناءً على طلب بسيط يقدم للطبيب؛ يترك المجال لأي طبيب أو أي مستشفى خاص لرفض متابعة طلب الإجهاض؛ تسعى جاهدة إلى قصر عمليات الإجهاض على حالات الضرورة ومنعها من أن تصبح وسيلة لتنظيم النسل؛ لا ينص على سداد الضمان الاجتماعي للنفقات، ولكن للمساعدة الطبية عند الطلب.

1967

٢٨ ديسمبر

يصرح القانون رقم 1176 - 67 المتعلق بتحديد النسل، والمعروف باسم "قانون نيووبرت" Neuwirth law، بتصنيع واستيراد موائع الحمل وبيعها الحصري في الصيدليات بوصفه طيبة، مع إذن الوالدين للقصر، ويحظر أي إعلان تجاري أو دعاية لتحديد النسل.

